

# おくすり説明書

2026年2月24日

1 / 2

9階病棟

患者ID: 0000439760

マイカチセ

前岡 千勢 様


診療科: 内科

おくすり

のみ方

薬の作用

## 1. <5mg>ドネペジル塩酸塩OD錠



のみ薬 (錠)

起床	朝	昼	夕	眠前
-	1	-	-	-

1日1回 朝食後

2026/02/24(火)

脳内の神経を活性化して、症状の進み方を抑えます。


【副作用】

意識がなくなる、胸が痛い、便が黒い、発熱、皮膚や白目が黄色い、歯ぐきや鼻からの出血、頭痛、けいれん、震え、筋肉の強ばり・痛み、息がしにくい、胃のあたりの激しい痛み、尿が出にくい、手足に赤いはん点、発疹等が現れたら、医師・薬剤師に相談して下さい。

【生活上の注意】

意識が薄れる、めまい等の症状が現れることがあるので、自動車の運転、危険を伴う機械の操作や高所での作業はしないようにしましょう。口の中で溶けますが、だ液か水で飲み込んで下さい。寝たままの状態では、水なしで服用しないで下さい。湿気を避けて保管して下さい。

## 2. アルファカルシドール錠0.25μg



のみ薬 (錠)

起床	朝	昼	夕	眠前
-	1	-	-	-

1日1回 朝食後

2026/02/24(火)

ビタミンDを補給して、カルシウムの吸収を高めて、骨がもろくなる等を改善します。

【副作用】

むくみ、体がだるい、尿が出にくい、皮膚や白目が黄色い、発熱、発疹等の症状が現れたら、医師・薬剤師に相談して下さい。

【生活上の注意】

光や湿気を避けて保管して下さい。

## 3. セパミット-R細粒2%



のみ薬 (mg)

起床	朝	昼	夕	眠前
-	10	-	-	-

1日1回 朝食後

2026/02/24(火)

血管に作用して、血管を広げて、血圧を下げたり、狭心症の発作を予防します。


【副作用】

全身が赤い、発疹、発熱、のどが痛い、体がだるい、歯ぐきや鼻からの出血、息がしにくい、意識が薄れる、皮膚や白目が黄色い、かゆみ、赤や紫のはん点等の症状が現れたら医師・薬剤師に相談して下さい。

【生活上の注意】

自分の判断で勝手に服用を中止しないで下さい。めまい等が現れることがあるので、自動車の運転、危険を伴う機械の操作や高所での作業には注意して下さい。グレープフルーツ果実やジュースは避けて下さい。なるべく日に当たりすぎないようにしましょう。かみ砕かずに服用して下さい。

## 4. ウルソデオキシコール酸錠100mg



のみ薬 (錠)

起床	朝	昼	夕	眠前
-	0.5	0.5	0.5	-

1日3回 朝昼夕 食後

2026/02/24(火)

胆汁を出やすくして、肝臓の働きや消化不良を改善したり、胆石を溶解します。

【副作用】

発熱、せき、息がしにくい、発疹、かゆみ、じん麻疹、赤いはん点等の症状が現れたら、医師・薬剤師に相談して下さい。

【生活上の注意】

脂肪やコレステロールの多い食品は避けて、繊維の多い食品を取るように心がけましょう。アルミニウムを含む制酸剤(胃薬)を服用する必要がある時は同時に服用しないで時間をずらして下さい。

患者さんへ

お薬は、適量の水またはぬるま湯でお飲み下さい。  
何か異常がありましたら、医師、薬剤師にご連絡下さい。

上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

(財)六甲アイランド 甲南病院

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目11番地  
TEL:078-858-1111

患者ID: 0000439760

マイカチセ

前岡 千勢様


診療科: 内科

おくすり

のみ方

薬の作用

## 5. レシカルボン坐剤(新)



坐薬

1個

肛門挿入(頓用) 便秘時

2026/02/24(火)

直腸内で発生する炭酸ガスが腸管を刺激して排便を促し、便秘を改善します。


【副作用】

顔色が青い、息がしにくい、めまい等の症状が現れたら、医師・薬剤師に相談して下さい。

【生活上の注意】

坐薬は直腸内にだけ使用し、飲まないで下さい。冷蔵庫等低温の場所で保管して下さい。朝食を十分とって、繊維の多い野菜、こんにゃく、豆類、牛乳、ヨーグルトを食べましょう。

## 6. ピコスルファートナトリウム内用液0.75



のみ薬

(本)

内服/全量 便秘時

2026/02/24(火)

大腸を刺激して、便を出しやすくします。

【副作用】



大腸検査前に服用した場合に、腹痛、お腹がはる、むかつき、血の混じった水のような下痢、めまい、意識がなくなる等の症状が現れたら、医師・薬剤師に相談して下さい。

【生活上の注意】

目薬ではありません。便秘の方は、朝食を十分とって、特に繊維の多い野菜、こんにゃく、豆類、牛乳、ヨーグルトを食べるようにしましょう。光を避けて保管して下さい。

【\*\*\*\*\*】 \*\*\*

注意事項に記載の副作用については、一部の患者さんにしか起きません。また全ての副作用について記載しているわけではありません。いつもと違った症状が現れたら、早めにご相談ください。



患者さんへ

お薬は、適量の水またはぬるま湯でお飲み下さい。  
何か異常がありましたら、医師、薬剤師にご連絡下さい。

上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

(財)六甲アイランド 甲南病院

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中2丁目11番地  
TEL:078-858-1111